

Rebutia

Slægten *Rebutia* er til stadighed om-diskuteret blandt botanikere. For nemheds skyld har man samlet fem tidligere slægter i *Rebutia*, mens man afventer yderligere genetiske studier.

- 1) *Weingartia*
- 2) *Sulcorebutia*
- 3) *Mediolobivia*
- 4) *Aylostera*
- 5) *Rebutia*

Udseende: Det er lavtvoksende mest gruppeddannende planter, kugleformede til let cylindriske. Tornedragten variabel, men ofte svag. Udvikler mange blomster i hele farveskalaen - (dog ikke blå).

Udbredelse: Bolivia, Argentina


Antal: 28 arter + utallige underarter.

Dyrkning: Nemme begynderplanter der blomstrer overdådigt. Tåler de fleste jordblandinger. Vandes og gødskes påent om sommeren. Overvintrer tørt og lyst og gerne ned til 5-6°C. For varm overvintring hæmmer den følgende blomstring.

 *Rebutia* er ret følsomme over for spindemider. Vær opmærksom på miderne, idet de kan skamfere en hel plante. Lav evt. med mellemrum en forebyggende behandling. Forskellige midler kan fås i handelen.




Rebutia er bjergplanter og kræver derfor max. lys for at trives og blomstre. Her anbragt i hængepotter tæt ved glasset i drivhuset. God ventilation er nødvendig for at undgå forbrændinger.




Rebutia arenacea
(*Sulcorebutia arenacea*)



Rebutia deminuta
(*Rebutia spegazziniana*)



Rebutia breviflora
(*Sulcorebutia caineana*)



Rebutia fabrisii
(*Aylostera fabrisii* var. *aureiflora*)



Rebutia einsteinii ssp. *aureiflora* (*Rebutia euanthema*)



Rebutia fiebrigii (*Aylostera fiebrigii*)